



# МИЗОПРОСТОЛ

## Рекомендуемые Дозы

	1 триместр Беременности	2 триместр Беременности	3 триместр Беременности	После родов
<b>800 МКГ</b>	<b>Прерывание нежелательной беременности</b> <sup>1,2</sup> 800 мкг. Вагинально. Интервал 12 часов. Мах 3 дозы			
	<b>Прерывание замершей беременности</b> <sup>3</sup> 800 мкг. Вагинально. Интервал 3 часа. Мах 3 дозы ИЛИ			
<b>600 МКГ</b>	600 мкг.Сублингвально Интервал 3 часа Мах 2 дозы			<b>Лечение послеродового кровотечения и профилактика</b> <sup>6</sup> 600 мкг. Перорально или сублингвально Однократно
	<b>Неполный аборт</b> <sup>2,3</sup> 600 мкг. Перорально Однократно			
<b>400 МКГ</b>	<b>Подготовка шейки матки перед инструментальным вмешательством</b> 400 мкг. Вагинально за 3 часа до процедуры	<b>Прерывание нежелательной беременности</b> <sup>1,2,4</sup> 400 мкг.Вагинально. Интервал 3 часа. Мах 5 доз		
<b>200 МКГ</b>		<b>Внутриматочная гибель плода</b> <sup>4</sup> <b>(13-17 недель)</b> 200 мкг. Вагинально. Интервал 6 часов Мах 4 дозы		
<b>100 МКГ</b>		<b>Внутриматочная гибель плода</b> <sup>4</sup> <b>(18-26 недель)</b> 100 мкг. вагинально Интервал 6 часов. Мах 4 дозы		
<b>50 МКГ</b>			<b>Внутриматочная гибель плода</b> <sup>5</sup> <b>(27-43 недель)</b> 50 мкг. Вагинально Интервал 4 часа. Мах 6 доз	
<b>25 МКГ</b>			<b>Родовозбуждение</b> <sup>2,5</sup> 25 мкг. Вагинально Интервал 4 часа. Мах 6 доз ИЛИ 20 мкг. Перорально в виде раствора Интервал 2 часа Мах 12 доз	
		<b>Особенную осторожность следует соблюдать при наличии рубца на матке и после кесарева сечения</b>		

Смотрите обновления на сайтах [www.figo.org](http://www.figo.org) и [www.misoprostol.ru](http://www.misoprostol.ru)

1. Использовать там, где это разрешено
2. Включено в список лекарственных средств ВОЗ
3. Ожидать в течение 1-2 недель, несмотря на кровотечение или при наличии инфекции
4. Половина дозы, если в анамнезе - кесарево сечение

5. Не использовать если в анамнезе кесарево сечение: быть уверенным, что вы используете правильную дозу, т.к. передозировка может привести к осложнениям
6. Окситоцин следует использовать в первую очередь, так как он является более эффективным, чем мизопростол